

## 刚果红染色液（1%）

货号：PMK0437

保存：室温避光，有效期一年。

规格：100ml

### 产品简介：

淀粉样物质是一种无固定形状的细胞外嗜酸性物质，可存在于不同的组织、器官，导致的疾病称为淀粉样变。淀粉样物质主要是由蛋白质构成，该蛋白大部分排列成反向的 $\beta$ -折叠层结构。在电子显微镜下淀粉样物质呈原纤维排列，病例材料中为大量细胞外的不分支的细丝，大多随机排列。用于识别淀粉样物质的组织学方法有甲紫染色、刚果红染色、偏振光显微镜观察等。目前研究发现传统的甲紫染色法灵敏度低、特异性差，经典的而且有效的方法是刚果红染色，1922年 Bennhold 发现了刚果红可以用于活体内淀粉样物质的鉴别，并应用到组织切片。

刚果红染色液(1%)染色原理是淀粉样物质对刚果红比其他的组织结构具有更大的亲和力，其羟基与刚果红的氨基结合，从而使淀粉样物质染成红色。

### 产品内容：

货号	名称	PMK0437-100
PMK0437	刚果红染色液(1%)	100ml

### 操作步骤：

1. 常规固定，常采用 10%的中性福尔马林，常规脱水包埋。
2. 切片厚度 4 $\mu$ m，常规脱蜡至水。
3. 入刚果红染色液(1%)，浸染 30min。
4. 进行后续染色步骤。

### 染色结果：

淀粉样物质红色

### 注意事项：

1. 切片脱蜡应尽量干净，否则影响染色效果。
2. 刚果红染色液染色时尽量采用浸染，如果滴染，应置于湿盒防止溶液挥发。
3. 分化时间较短，胶原纤维也被染成红色；分化过度，淀粉样物质也被脱色。如果脱色过度，可以将切片清洗后重新用刚果红染色液浸染。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

PMK1300 考马斯亮蓝蛋白胶快速染色液

PMK053 GAPDH mAb-HRP conjugated

## 产品说明书

PMK0312 抗体稀释液

PMK1700 PBST 缓冲液

PMK1020 IPTG 溶液 (50mg/ml)

PMK1010 30%丙烯酰胺(29:1)

更多产品详情了解，请关注公众号：

